

~~274~~

n.º 98.

figure tirée de M^r Mongeyni



Lü le 16 May 1744.

6 May 1744.

De la Situation des Orifices des
Coronaires du Cœur, par rapport aux
Manieres différentes dont on pense qu'elles
sont abordées par le Sang à chaque
Sistole; et pour l'éclaircissement du Sujet,
il sera parlé en même tems des Valvules
Sigmoïdes, et de la Disposition Singulière
du Commencement de l'Aorte.

qui ne doit se rappor-
ter qu'à un tems

Des Anatomistes du premier ordre se sont
donné bien de la peine pour conclure différemment sur cette
Question, pendant le tems de la Sistole du Cœur.

^a
Adv. Anat. 4.
animadvers. 25. pag. 37.

¹¹
(Dans la supposition qu'il
le Passage aërien
d'ailleurs)

⁶
De Motu Cord. et Anoris.
mat. Lyp. Gr. Edit. Neap.
pag. 92. 93.

M. Morgagni^a prétend que les Cas où le Sang pourroit
passer par les Orifices Coronaires, ^{seulement} lorsque ces Orifices sont
supérieurs aux Valvules Sigmoïdes ou près de leur bord; mais
qu'il n'a voit pas la même facilité, quand ils sont trop
bas et cachés par les Valvules. M. Lancisi^b de son côté
assure que de quelque façon que se trouvent ^{placés} les Orifices,
le Sang y a toujours une ^{entrée} libre; avec cependant une
modification à leur égard pour la quantité, selon que leur
Situation varie.

On verra mieux, j'écrois, dans un autre Mémoire

ARC 25 d. 53



qui suivra Celui-ci, de quelle ~~manière~~ — sont toutes ces Remarques et à quoi l'on doit s'entendre.

Les ^{deux} grands ~~fontaines~~ que j'eus des hommes ont reconnu trois sortes de Positions à ces Orifices, selon^t les ^{variations} qu'ils ont eues pour appercevoir,

1^o Cachés derrière les Valvules sigmoïdes,

2^o Au-niveau de leur bord,

3^o Au-dessus c. ad. plus à découvert,

de sorte ^{répondant} que l'un des deux Orifices occupe assez souvent une de ces Situations, l'un se trouvant au-dessus de l'autre ~~sur la longueur de l'Arterie~~.

Néanmoins en étudiant l'espace de l'Arterie où sont placés ces Orifices, j'ai trouvé qu'on pouvoit considérer tout différemment leur Position; et le Plan que je m'en suis formé sur la structure me semble plus simple et plus vrai. Ce ~~fait~~ d'Anatomie demande d'être rectifié; il le mérite d'autant plus qu'il n'est pas d'une légère utilité pour l'exacte Discussion du Passage du Sang par les Orifices coronaires.

Je ne sais trop de quel point de vue il a fallu regarder les Orifices pour les appercevoir sous les aspects que j'ai rapportés. Il n'est pas facile d'avoir une véritable hauteur à laquelle on puisse ajuster les Valvules pour de là les voir recouvrir ou laisser à découvert les Orifices. Car
quel

quel allongement précis donner aux Valvules mobiles et laches comme elles sont; et à quelle proximité certaine des Barois de l'Aorte les placer? Voilà les Doutes que leur ^{conformation} ~~structure~~ doit faire naître.

On a sans doute supposé trois Dispositions de Casties: Sçavoir 1.^o que l'Aorte, dans l'endroit qui environne les Valvules, a un Calibre parfaitement continu et régulièrement circulaire: 2.^o que les Orifices ont une Situation absolument indéterminée: 3.^o que par l'impulsion du sang hors du Cœur les Valvules peuvent s'approcher tout à fait des Barois de l'Aorte et clore entièrement par leur expansion les Embouchures coronaires.

Ces Suppositions sur lesquelles il y a, comme semble, bien du mécompte et qu'il est nécessaire de discuter, ne vont donner lieu d'exposer quelques Structures nouvelles qu'on a laissées échapper. ^{Ces Structures} ~~elles ont~~ conduit à des Expériences, et à des Conséquences ^{particuliers}.

1.^o Tout le monde croit communément que l'Aorte commence par un Principe large qui doit toujours aller en diminuant. Mais en observant de près, on voit quelle n'est pas construite de cette façon. Depuis son adhérence avec le Cœur jusqu'à l'endroit où se terminent les extrémités ou attaches des Valvules, son Calibre ne forme pas une circonférence exacte et unie. L'Aorte, ce qui est fort différent, fait derrière chaque Valvule un enfoncement voûté qui paroît formé par le retrecissement sensible qu'elle subit

and.



au dessus et proche les attaches des Valvules.

Ces Enfoncements, en forme d'impression du doigt, que l'on peut nommer Valvulaires à cause qu'ils répondent aux Valvules, sont tels que quand on regarde au dedans du Canal, après l'avoir fendu jusqu'à une ^{petite} ~~légère~~ distance de son rétrécissement, les Orifices Coronaires ne se laissent pas appercevoir.

En examinant encore avec les doigts introduits par le côté du Cœur on trouve en effet que l'Aorte est bien plus resserrée au dessus des Valvules qu'à l'ouverture du tendon orbiculaire du Cœur auquel elle est attachée; et en regardant par dedans son Ventricle on voit distinctement ce Débois de l'Aorte.

J'ajouterai ici par manière d'Observation, qu'à prendre de ce resserrément, l'Aorte s'élargit d'abord à mesure qu'elle monte, et parvient ainsi à son plus grand Diamètre au milieu du Cras qui est entre les attaches des Valvules et la première Distribution supérieure de l'Arcade; qu'ensuite, passé ce milieu, l'Aorte commence à diminuer insensiblement. Pour l'Aorte du Boumou, elle diffère en ce que son ~~plus grand~~ Diamètre est plus considérable près du Cœur d'où elle prend d'abord imperceptiblement la forme de Cône.

Outre la Disposition de l'Aorte pour la forme de son

J'ai trouvé que Loxer qui ne décrit ^{point} cette Conformation, l'a fort bien représentée. Tract. de Cordo
tab. 2. fig. 4.

^a
Advers. Anat. 1.
Tab. 4. fig. 3.

son calibre ~~est~~ ^{est} près le Cœur, il en faut remarquer l'épaisseur différente selon les endroits. On pense sans le moindre doute que l'Arterie doit être fort épaisse près son ouverture dans le Cœur; parmi des figures d'ailleurs bien excellentes elle en ainsi représentée; cependant il est ~~pas~~ facile de s'affirmer du contraire.

Tout ce qui est derrière les Valvules en général fort mince: depuis l'endroit resserré qui fait un bord saillant jusques vers le Cœur, la substance de l'Arterie diminue d'épaisseur et semble n'être à la fin tout près de l'Orifice qu'une Membrane ligamentuse. Ainsi où ~~il y a des~~ ^{il y a} enfoncements il y a moins d'épaisseur. Cette Disposition n'est pas indifférente: ce Contour mince est une espèce de Jonction flexible et mitoyenne entre l'Arterie, pour ainsi dire, et le Cœur donc on verra ailleurs un Usage plus circonstancié.

Mais ce qui répond au Bord circulairement saillant au dessus des extrémités des attaches des Valvules, est fort épais de même que la suite du Canal: Aussi où l'Arterie est resserrée, Elle forme une seconde Embouchure étroite et élastique qui mène à l'espace plus élargi, dont j'ai déjà parlé, que l'on pourroit regarder comme une sorte de Sinus de cette principale Arterie.

Lac



La nouvelle Embouchure est si bien marquée du côté du Cœur, que quelque tiraillement que l'on fasse à l'Aorte même après l'avoir fendue entièrement on ne peut la faire disparaître le relief que produit l'augmentation d'épaisseur de substance.

Cette Avance qui est plus ou moins considérable selon les Sujets, devient transversale par la coupe de l'Aorte. C'est immédiatement au-dessous que sont situés les enfoncements qui se rencontrent derrière chaque Valvule. Le fameux Lairesse Dessinateur de Bidloo, qui ^{ne dit} rien à ce sujet dans l'explication de sa figure, parait en avoir assez bien donné les Ombres; mais il n'a pas ~~rien~~ marqué l'Avance angulaire dont il s'agit qui ^{borne} ~~termine~~ par en haut les enfoncements; il les termine comme on le voit dans les Sujets avancés en âge, où l'Avance ^{est} brisée, et ~~faite~~ ^{du haut} ~~une espèce~~ de chaque enfoncement ^{comme une} d'Arcade. C'est ce que Cowper et son Traducteur en latin, ont parfaitement imité.

2°. La Diversité prétendue de la situation des Orifices coronaires dans un même Sujet ou dans plusieurs séparément, est devenue sans trop de fondement un Objet d'élégance de Décision et de conséquence pour l'événement. On a cru voir exactement que tous les deux Orifices peuvent être plus ou moins élevés du bord des Valvules; ou que l'un des deux est au hasard tantôt plus haut,

haut, tantôt plus bas.

on peut ^{trouver} la réduire,
ou la déterminer
à un point fixe.

Quoiqu'on en dise, cette Situation ne varie pas tant
que plusieurs l'ont pensé. Je ferai donc remarquer qu'en
général les Orifices quant à la Position sont bornés par
le rétrécissement circulaire de l'Aorte et qu'ils sont toujours
immédiatement au-dessous. Néanmoins celui qui est placé à
gauche et en arrière parait ^{être} constamment percé un peu plus
bas ~~et jamais plus haut~~ plus près de l'Ouverture du Cœur,
et jamais plus haut. Pour l'Orifice antérieur je l'ai
presque toujours trouvé proche le haut de l'enfoncement
valvulaire qui le renferme; Cette différence ^{non m'est} ~~devenue~~
^{si simple} Orifices aient de la seule Conformation de la base du
Cœur dont la substance s'élève davantage du côté de
l'Aorte du Cœur. ^{Un} et l'autre de ces Orifices en
situe à une distance suffisante ^{de l'entrée} du Cœur pour ne pas se
rencontrer d'abord dans ses fibres charnues, ce qui pendant
la Contraction de cet Organe auroit eu de grands inconvénients
si le Sang doit alors entrer dans les Orifices. ~~en ce cas etc~~

Comme l'Aorte à
son commencement
se plonge ^{en quelque manière} dans
la substance du Cœur

Cherchez comme Ceux qui admettent une Variation
fortuite à l'égard de la hauteur des Orifices, conviennent
qu'ils sont plus ordinairement assés élevés, en ce cas ils
s'offrent ^{encore} plus favorablement au fluide de l'Aorte, ce
avec fortifie ce que je viens d'exposer; et il y a lieu de
soupçonner, comme on le va voir, que quelques circons-

tances



circonstances particulières en égard aux Valvules, avec les quelles on a eu trop de soin de les mettre en comparaison, ont fait prendre le change quand ils ont ~~été~~ plus bas.

3.^o Pour mieux combiner la hauteur des Orifices — dans l'Aorte on veut qu'ils ~~soient~~ soient en différents rapports avec les bords des Valvules : on dit qu'ils sont au-dessus ; sur la même ligne ; ou au-dessous de ce même bord, et dans ce dernier cas les Valvules à ce que l'on ajoute les cachent et les ferment. Mais y a-t-il bien lieu de se procurer une mesure certaine avec laquelle on puisse réciproquement assujettir les Orifices aux Valvules, ou les Valvules aux Orifices ?

J'ai montré ci-dessus ce qui fixe assez sûrement la hauteur des Orifices dans l'Aorte ; il n'en peut pas être de même des Valvules quand on veut déterminer la leur, soit pour cacher, soit pour laisser à découvert les Orifices. Ces Valvules sont des Membranes d'un tissu tel, que, dans le sens propre à faire illusion, elles peuvent prêter aux doigts ou à l'instrument de l'Anatomiste et s'approcher davantage du niveau des Orifices ou même les surpasser, lors qu'on ne croira que leur procurer un état naturel.

Outre cette difficulté quant à l'allongement en
hauteur,

hauteur donc sont susceptibles les Valvules, on est encore arrêté par ailleurs.

Il a été observé que le calibre de l'Aorte en-
creuse derrière chaque Valvule; et que c'est dans deux
de ces enfoncemens que sont les Orifices. De là naît d'abord
un obstacle considérable à l'approche, que l'on a imaginée;
des Valvules contre les Parois de l'Aorte et en même
tems sur les Orifices. Mais à juger seulement par ~~l'inspec-~~
l'inspection anatomique, n'ayant encore égard à ce qui
doit être de plus dans le vivans où le fluide ~~qui se~~
~~meut~~ c. ad. le sang ^{qui en même} détermine puissamment l'état des
Valvules, il y a je crois un nouveau moyen de faire
appercevoir l'extrême difficulté ~~quelles~~ quelles doivent
avoir pour fermer les Orifices. Que l'on examine de
plus près quel peut être la forme et la Connexion de ces
Valvules, on verra que même les Orifices, dont la situa-
tion a été regardée comme la plus basse, ~~sont toujours~~
suffisamment à découvert.

A l'aide d'une disposition digne d'être remarquée les Valvules sigmoïdes sont écartées des parois par le bas. Elles s'unissent pour la plus grande partie avec l'aorte et le reste avec le Cœur. La connexion de leur tiers inférieur ne ressemble pas tout à fait à la façon dont sont appliqués à une muraille des paniers de Ligeon ce que l'on

l'on a dit ; dans cette partie Elles ressemblent plutôt à ces gorges qui se terminent par un fond plat. Ce fond qui est incliné à l'égard des Valvules est formé par la substance même du Cœur ; et des trois Valvules ce fond est plus considérable à la Valvule antérieure qu'aux Deux autres qui répondent en commun plus ou moins à la base de la Valvule Mitrale que l'on ~~voit~~ ^{croit} être mitoyenne aux Deux Passages du Ventricule gauche du Cœur qui n'ont point d'autre séparation.

fondé sur l'accord de ces divers arrangements de Structure, il est convenable pour repandre plus de clarté sur le Sujet de ce Mémoire, d'ajouter à ce qui précède les Raisonnemens suivans.

1.^o Quoique l'on soit sûr que le Sang poussé par la Systole du Cœur jette les Valvules de l'Aorte dans le plus grand écartement où elles puissent être les unes des autres ; il est vraisemblable de croire que cet écartement n'est pas si considérable que bien des gens se le sont imaginé, et qu'il les laisse toujours assez distantes des parois ; ~~parce que par un autre effet du sang~~ ce qui doit avoir son utilité, ~~consistant~~ ^{consiste} dans la prise au sang pour les Chutes alternatives.

Entrant, Buisson.
Inst. Med. §. 132.
Nicolas de Direct.
Vas. §. 6. pag. 23.

2.^o Il n'y a pas moins d'apparence que dans la Systole encore, les Valvules ne se mettent point, en s'aplatissant en quelque sorte, dans l'expansion considérable et forcée que des figures d'Anatomie ^{leur donnent} ~~représentent~~. Au-
contraire

Advers. Anat. 1.
Tab. 4. fig. 3.

À l'encontre leur attitude p. a. d. en s'être plissées sur
Elles-mêmes suivant leur hauteur; quoique sans doute bien
moins que ~~lors de la Diastole~~ lors de la Diastole du Cœur, dans leur dernier
degré d'approximation entr'elles. Maintenant si on se
représente l'effet de la Systole sur les Valvules il sera
alors aisé de juger que la force avec laquelle le nou-
veau Sang presse sur les Valvules à mesure qu'elles s'écar-
tent, doit être proportionnelle à celle qui surmonte la
résistance qu'il trouve devant lui. Qu'ainsi en même
temps qu'il pousse en avant la Colonne de Sang, qui vient
de refluer sur elle-même par le resserrement précédent
de l'Aorte, ^{une portion} ~~il doit se détourner~~ une portion de ce nou-
veau Sang doit se détourner et revenir vers les cavités
des Valvules; effet qui sûrement les maintiendra surbaïs-
sées et écarts de la circonférence.

Il faut donc de cette manière que les Valvules ne
s'élèvent que peu quand elles montent par la pression
latérale du fluide sur leur convexité. C'est ce que l'on
ne pourra refuser d'accorder si l'on pense à l'état où on
été laissées les Valvules par la contraction de l'Aorte.
Certainement pendant cet intervalle leurs bords doivent
être déprimés les uns sur les autres et enfoncés vers le
Cœur; car la forte réaction de l'Aorte doit l'emporter
de



de beaucoup sur le sang qui est du côté du Cœur au
dessus des Valvules.

Pour prouver encore que les Valvules restent ^{un peu} distan-
tes des parois ~~au moment~~ pendant la sistole, l'Anatomie Gra-
tigue, ^{semble venir} ~~se~~ aussi à l'appui; elle éclaircit le Physiologique
qui sert à l'expliquer à son tour. On ~~l'a~~ ^{l'a} dans des Ou-
vertures de ~~Cadavres~~ ^{Cadavres} ~~qui ont été faites~~ ^{ou après}, les Valvules, contre
l'ordre naturel, en parties ossues et en parties cartilagi-
neuses; d'autrefois toutes ossues: ce qui montre avec
quelque sorte d'évidence que les Valvules n'ont pas
besoin de s'appliquer aux parois pour concourir à la
décharge du Cœur. Et s'il est survenu des Dilatations
forcées aux gros Vaisseaux voisins de, ce n'est pas tant
parcequ'elles ne se laissent pas aplatis comme il
leur fallu, qu'à cause qu'elles ne se fermoient ^{pas}; le
sang n'étant point soutenu pendant la Diastole, devoit
refouler dans le Cœur et lui offrir ^{une} ~~plus~~ résistance étran-
gère au sang qui lui vient d'ailleurs et prendre de sa
place.

Je finirai par une expérience que j'ai faite pour
imiter autant qu'il ~~est~~ ^{me paraît} possible, l'effet de l'impulsion du
sang ^{poussé par le Cœur} sur les Valvules supposées pleines, comme elle le sont
pendant la Diastole. J'ai coupé transversalement un
Cœur

qui s'occupe de
la recherche des
causes de Maladies
et de Mort,

^a
du j'avois laissé une
portion du commence-
ment de l'Arterie suffi-
samment ouverte, et

^{na}
dans le plus fond de
la Contraction

Cœur, néanmoins un peu plus du côté de la Base.
Ayant pris cette moitié ^{de} la tenant de manière que
les ouvertures des Valvules Sigmoïdes ~~devant~~ regardoient
en haut; je l'ay plongée dans cette situation je l'ai plongée
rapidement et à plusieurs reprises; alors les Valvules
qui s'étoient dilatées ~~par~~ l'eau et qui y demouroient dans
cet état, ne s'écartoient que très peu pour ^{donner issue à} l'eau d'au-dessous d'elles. Ce que présente cette tentative
n'indique-t-il pas que le Sang ne son pas du Ventricle
de toute la largeur de son orifice; et ne fait qu'écarter
moderement les Valvules? Pour qu'il en arrivât autre-
ment, il faudroit qu'il y eût ~~écoulement~~ ^{une irruption de} la Colonne de
Sang Supérieure, plus de Sang que le Cœur n'en pousse
à la fois.

Si présentement j'ai mis en état de considérer la
Position reculée et la hauteur assez uniforme des Orifices,
et de les rapporter à la double connexion ^{des Valvules (a)} et leur jeu naturel
~~des Valvules~~; je pense avoir suffisamment établi, dans ce
cours l'exposé que j'en viens de faire, que les Orifices ne
peuvent point être bouchés ni même gênés par les Val-
vules.

(a)
Les Valvules Sigmoïdes
que l'on trouve unies
qu'à l'Arterie, le sont aussi
à la substance du cœur,
comme je l'ai
fait voir.

Lu par M^r Cassini le 16 may 1744

Cassini



ARC 25 d 53

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The script is cursive and difficult to decipher due to fading and ink bleed-through.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The script is cursive and difficult to decipher due to fading and ink bleed-through.